


CODICE CORINE BIOTOPES <b>15.6 BASSI CESPUGLIETI ALOFILI</b>	
EUNIS <b>&lt;A2.5</b>	DH <b>= 1420</b>
SINTASSONOMIA <b><i>Sarcocornietea fruticosae</i> (syn. <i>Arthrocnemetea fruticosi</i>)</b>	
DESCRIZIONE Formazioni dei suoli limosi, molto salati e con ampio disseccamento estivo. Sono dominate da piccoli cespugli a fusti carnosi ( <i>Arthrocnemum</i> , <i>Suaeda</i> , <i>Halocnemum</i> , <i>Limoniastrum</i> e <i>Halimione</i> ). Questi microcespuglieti possono frammischarsi ad alcune specie di <i>Limonium</i> ( <i>L. densissimum</i> e <i>L. bellidifolium</i> ). Possono occupare anche vaste superfici dette "barene". Sono inclusi i cespuglieti mediterranei (15.61) diffusi su tutto il territorio nazionale e le formazioni termomediterranee a <i>Limoniastrum monopetalum</i> della Sicilia (15.63).	
SOTTOCATEGORIE INCLUSE 15.61 Cespuglieti alofilo mediterranei 16.63 Cespuglieti termofili a <i>Limoniastrum</i>	
SPECIE GUIDA <i>Aeluropus lagopoides</i> , <i>Artemisia gallica</i> , <i>Cynomorium coccineum</i> subsp. <i>coccineum</i> , <i>Elymus elongatus</i> subsp. <i>elongatus</i> , <i>Halimione portulacoides</i> , <i>Halocnemum strobilaceum</i> , <i>Limoniastrum monopetalum</i> , <i>Limonium densissimum</i> , <i>Limonium bellidifolium</i> , <i>Puccinellia convoluta</i> , <i>Sarcocornia fruticosa</i> , <i>Sarcocornia perennis</i> , <i>Suaeda vera</i> , <i>Triglochin bulbosum</i> subsp. <i>barrelieri</i> .	
REGIONE BIOGEOGRAFICA Continentale - Mediterranea	
PIANO ALTITUDINALE Costiero	
DISTRIBUZIONE Lagune nordadriatiche, Stagni della Sardegna, Sicilia, Toscana, Puglia	
	
NOTE -	