


CODICE CORINE BIOTOPES <b>16.22 DUNE GRIGIE</b>	
EUNIS =B1.4	DH > <b>2130</b> (sottocategoria 16.221) <b>PRIORITARIO</b> > <b>2210</b> (sottocategoria 16.223) > <b>2230</b> (sottocategoria 16.228) > <b>2240</b> (sottocategoria 16.229) <b>PRIORITARIO</b>
SINTASSONOMIA <b><i>Corynephoretalia canescentis</i>, <i>Crucianellion maritimae</i>, <i>Malcomietalia</i></b>	
DESCRIZIONE Si tratta di formazioni stabilizzate e quindi non più influenzate direttamente dai venti marini. Il substrato è quasi dissalato e si può formare un primo strato di suolo. Le dune grigie sono colonizzate da specie erbacee perenni e/o annuali. La composizione varia nei diversi bioclimi. Le aree nord-adriatiche possono rientrare in tipologie atlantiche con gli habitat a cerasti annuali ( <i>Cerastium semidecandrum</i> , <i>C. dubium</i> , <i>Silene conica</i> ), mentre quelle dell'Italia mediterranea nelle associazioni con <i>Crucianella maritima</i> (16.223), in quelle con piccole specie effimere ( <i>Malcomia</i> , <i>Evax</i> ) o dei pascoli xerici dei <i>Thero-Brachypodietae</i> (16.229). Spesso ricoprono superfici ridotte e formano mosaici con le categorie successive.	
SOTTOCATEGORIE INCLUSE 16.221 Dune grigie settentrionali (Adriatico settentrionale) 16.223 Dune grigie mediterranee 16.228 Comunità a specie annuali 16.229 Praterie xeriche delle dune	
SPECIE GUIDA <i>Akanna tinctoria</i> subsp. <i>tinctoria</i> , <i>Ambrosia coronopifolia</i> , <i>Ambrosia maritima</i> , <i>Anthemis tomentosa</i> , <i>Carex arenaria</i> , <i>Carex praecox</i> , <i>Catapodium marinum</i> , <i>Cerastium dubium</i> , <i>Cerastium diffusum</i> , <i>Cerastium semidecandrum</i> , <i>Corynephorus articulatus</i> , <i>Corynephorus canescens</i> , <i>Corrigiola telephiifolia</i> , <i>Crucianella maritima</i> , <i>Cutandia maritima</i> , <i>Cutandia divaricata</i> , <i>Ephedra distachya</i> , <i>Helichrysum stoechas</i> , <i>Koeleria cristata</i> , <i>Lotus cytisoides</i> , <i>Malcomia maritima</i> , <i>Malcomia nana</i> , <i>Malcomia parviflora</i> , <i>Malcomia ramosissima</i> , <i>Matthiola sinuata</i> , <i>Matthiola tricuspidata</i> , <i>Parapholis incurva</i> , <i>Parapholis marginata</i> , <i>Ononis variegata</i> , <i>Pycnocomon rutifolium</i> , <i>Rostraria litorea</i> , <i>Silene conica</i> , <i>Silene colorata</i> , <i>Silene nicaensis</i> , <i>Silene sericea</i> , <i>Tortula ruraliformis</i> , <i>Vulpia fasciculata</i> .	
REGIONE BIOGEOGRAFICA Continentale - Mediterranea	
PIANO ALTITUDINALE Costiero	
DISTRIBUZIONE Sistemi dunali fossili; esempi significativi sono presenti nel Lazio (dune del Parco Nazionale del Circeo, LT; Fascia costiera di Castelporziano, RM), Calabria (Laguna di Gizzeria, CZ), Sardegna (Penisola del Sinis, Is Arenas, OR), Puglia (tombolo del Lago di Lesina, FG), Emilia Romagna (dune di Massenzatica, dune di San Giuseppe, FE), Veneto (Dune di Donada, Contarina, Rosolino, Volto, Ariano Polesine RO); Sicilia meridionale.	
	
NOTE Habitat spesso frammentario e difficilmente cartografabile al 1:50000	