


CODICE CORINE BIOTOPES 16.27 GINEPRETI E CESPUGLIETI DELLE DUNE	
EUNIS <B1.63	DH = 2250 PRIORITARIO
SINTASSONOMIA <i>Juniperion lyciae</i> (Syn. <i>Juniperion turbinatae</i>)	
DESCRIZIONE Dune brune del tutto fossili che in ambiente mediterraneo vengono colonizzate da ginepri alto arbustivi. Essi sono per lo più <i>Juniperus oxycedrus</i> subsp. <i>macrocarpa</i> e <i>Juniperus phoenicea</i> . Queste formazioni sono estese in alcune spiagge sarde.	
SOTTOCATEGORIE INCLUSE 16.271 Dune a <i>Juniperus oxycedrus</i> subsp. <i>macrocarpa</i> 16.272 Dune a <i>Juniperus phoenicea</i>	
SPECIE GUIDA <i>Juniperus oxycedrus</i> subsp. <i>macrocarpa</i> , <i>Juniperus phoenicea</i>	
REGIONE BIOGEOGRAFICA Continentale - Mediterranea	
PIANO ALTITUDINALE Costiero	
DISTRIBUZIONE Sistemi dunali; esempi significativi sono presenti in Sardegna, Toscana (Selva Pisana, PI; monte Argentario, GR), Lazio (Parco Nazionale del Circeo, LT; Riserva Naturale Statale Litorale Romano, Tenuta Presidenziale di Castelporziano; RM), Basilicata (Costa Jonica, MT), Puglia (Pineta dell'Arco Jonico; TA.)	
	
NOTE -	