


CODICE CORINE BIOTOPES 16.28 CESPUGLIETI A SCLEROFILLE DELLE DUNE	
EUNIS =B1.64	DH = 2260
SINTASSONOMIA <i>Quercion ilicis, Pistacio-Rhamnetalia</i>	
DESCRIZIONE Stadi di ricolonizzazione delle dune fossili da parte di specie della macchia mediterranea. E' importante distinguerli dai cespuglieti a sclerofille al di fuori dei sistemi paleodunali.	
SOTTOCATEGORIE INCLUSE -	
SPECIE GUIDA <i>Arbutus unedo, Artemisia arborescens, Cistus sp. pl., Clematis cirrhosa, Erica multiflora, Halimium halimifolii, Osyris alba, Phillyrea angustifolia, Phillyrea latifolia, Pistacia lentiscus, Prasium majus, Rhamnus alaternus, Rosmarinus officinalis, Teucrium fruticans, Teucrium flavum.</i>	
REGIONE BIOGEOGRAFICA Continentale - Mediterranea	
PIANO ALTITUDINALE Costiero	
DISTRIBUZIONE Sistemi dunali; esempi significativi sono presenti in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Molise (Petacciato, Campo Marino, CB), Toscana, Lazio, Puglia, Sicilia meridionale.	
	
NOTE -	