

<b>CODICE CORINE BIOTOPES</b> <b>16.29 DUNE ALBERATE</b>	
<b>EUNIS</b> <b>=B1.7</b>	<b>DH</b> <b>&gt; 2270</b> <b>PRIORITARIO</b>
<b>SINTASSONOMIA</b> <b><i>Quercion ilicis, Pistacio-Rhamnetalia, Berberidion</i></b>	
<b>DESCRIZIONE</b> Si intendono qui le pinete su dune fossili. Il sottobosco può essere formato sia da specie di sclerofille ( <i>Pistacio-Rhamnetalia</i> ) che caducifolie ( <i>Prunetalia</i> ). Sono inclusi anche alcuni impianti storici come nel Ravennate. Vanno ben distinte queste formazioni su dune fossili dagli altri boschi di pini mediterranei.	
<b>SOTTOCATEGORIE INCLUSE</b>	
<b>SPECIE GUIDA</b> <i>Pinus pinea, Pinus pinaster, Pinus halepensis, Pinus nigra</i>	
<b>REGIONE BIOGEOGRAFICA</b> Continentale - Mediterranea	
<b>PIANO ALTITUDINALE</b> Costiero	
<b>DISTRIBUZIONE</b> Sistemi dunali fossili; esempi significativi sono segnalati in Veneto (Laguna Veneta, VE), Puglia (laghi Alimini, LE), Lazio (Parco Nazionale del Circeo, LT), Toscana (lagune dell'Argentario, GR).	
	
<b>NOTE</b> -	