


31.2 *Brughiere secche*

Brughiere ad ericae dei piani basali e collinare.

CODICE CORINE BIOTOPES 31.22 BRUGHIERE SUBATLANTICHE A CALLUNA E GENISTA	
EUNIS =F4.2	DH = 4030
SINTASSONOMIA <i>Geniston pilosae</i>	
DESCRIZIONE Si tratta di formazioni secondarie di sostituzione, anche in caso di incendio, di boschi acidofili di querce, castagno, carpino bianco o faggio. Sono caratterizzate dalla dominanza di <i>Calluna vulgaris</i> , <i>Vaccinium sp.pl.</i> e <i>Genista sp.pl.</i> Si sviluppano nel piano collinare del margine delle Alpi. In questa categoria vengono incluse le brughiere submontane a mirtillo delle aree alpine (31.21).	
SOTTOCATEGORIE INCLUSE 31.228 Brughiere illiriche 31.229 Brughiere del bacino del Po	
SPECIE GUIDA <i>Genista anglica</i> , <i>Genista germanica</i> , <i>Genista pilosa</i> (caratteristiche), <i>Calluna vulgaris</i> , <i>Chamaecytisus hirsutus</i> , <i>Tuberaria lignosa</i> , <i>Empetrum nigrum</i> .	
REGIONE BIOGEOGRAFICA Alpina, Continentale	
PIANO ALTITUDINALE Collinare, Montano	
DISTRIBUZIONE Italia settentrionale 	
NOTE -	