


31.4 *Brughiere alpine e boreali*

Brughiere dei piani altitudinali superiori che possono rappresentare sia stadi di ricolonizzazione di pascoli abbandonati sia formazioni zonali o azonali della fascia subalpina superiore. Le formazioni a *Loiseleuria* non vengono mantenute separate per motivi di ridotte dimensioni.

CODICE CORINE BIOTOPES 31.42 BRUGHIERE SUBALPINE A RHODODENDRON E VACCINIUM	
EUNIS =F2.2	DH < 4060
SINTASSONOMIA <i>Rhododendro-Vaccinion, Ericion carneae</i>	
DESCRIZIONE Vengono raggruppate sotto questo codice tutte le brughiere altimontane e subalpine (con esclusione di quelle a <i>Juniperus communis</i> var. <i>nana</i>) diffuse in tutto l'arco alpino, su vari substrati e dominate da diverse specie. Le specie dominanti appartengono alla famiglia delle ericacee ed ai generi <i>Rhododendron</i> , <i>Arctostaphylos</i> ed <i>Erica</i> . Nelle quote inferiori sono stadi di ricolonizzazione di pascoli abbandonati in quelle superiori stadi durevoli.	
SOTTOCATEGORIE INCLUSE -	
SPECIE GUIDA <i>Arctostaphylos uva-ursi</i> , <i>Arctostaphylos alpina</i> , <i>Astrantia minor</i> , <i>Dryas octopetala</i> , <i>Empetrum hermaphroditum</i> , <i>Erica carnea</i> , <i>Genista radiata</i> , <i>Helianthemum alpestre</i> , <i>Loiseleuria procumbens</i> , <i>Rhododendron ferrugineum</i> , <i>Rhododendron hirsutum</i> , <i>Vaccinium gaultherioides</i> , <i>Vaccinium myrtillus</i> .	
PIANO ALTITUDINALE Montano, Subalpino, Alpino	
REGIONE BIOGEOGRAFICA Continentale, Alpina	
DISTRIBUZIONE Alpi, Prealpi	
	
NOTE Vengono raggruppate sotto questo codice tutte le brughiere altimontane e subalpine (31.41, 31.44, 31.47, 31.48 e 31.49), ad esclusione di quelle, a carattere più acidofilo, a <i>Juniperus nana</i> .	