


<b>CODICE CORINE BIOTOPES</b> <b>31.43 BRUGHIERE A GINEPRI NANI</b>	
<b>EUNIS</b> <b>=F2.2</b>	<b>DH</b> <b>&lt; 4060</b>
<b>SINTASSONOMIA</b> <b><i>Juniperion nanae, Daphno oleoidis-Juniperion alpinae, Pino-Juniperetalia</i></b>	
<b>DESCRIZIONE</b> Rappresentano le brughiere dei sistemi endalpici con maggior continentalità che si sviluppano prevalentemente su substrati non carbonatici e sono dominate da <i>Juniperus nana</i> (31.431) o in alcuni rari casi da <i>J. sabina</i> (31.432). Vengono qui inserite anche le brughiere a <i>Juniperus hemisphaerica</i> dell'Appennino meridionale e della Sicilia.	
<b>SOTTOCATEGORIE INCLUSE</b> 31.431 Cespuglieti a <i>Juniperus nana</i> 31.432 Cespuglieti a <i>Juniperus sabina</i> 31.433 Cespuglieti a <i>Juniperus hemisphaerica</i>	
<b>SPECIE GUIDA</b> <i>Juniperus communis</i> var. <i>alpina</i> , <i>Juniperus sabina</i> (Alpi), <i>Juniperus communis</i> var. <i>hemisphaerica</i> (Appennini centromeridionali e Sicilia) (dominanti) <i>Loiseleuria procumbens</i> , <i>Cetraria nivalis</i> , <i>Huperzia selago</i> , <i>Hylocomium splendens</i> , <i>Rhythidiadelphus triquetrus</i> (Alpi), <i>Daphne oleoides</i> , <i>Helianthemum grandiflorum</i> , <i>Rhodothamnus chamaecistus</i> , <i>Hypericum richeri</i> (Appennino).	
<b>PIANO ALTITUDINALE</b> Montano, Subalpino	
<b>REGIONE BIOGEOGRAFICA</b> Alpina, Continentale, Mediterranea	
<b>DISTRIBUZIONE</b> Alpi interne e cime maggiori dell'Appennino	
	
<b>NOTE</b> La recente revisione della check list della flora italiana (2005) include alcune forme di <i>Juniperus</i> come ad esempio <i>J. nana</i> , <i>J. hemisphaerica</i> , <i>J. alpina</i> sotto la comune denominazione <i>J. communis</i> . In questo caso è stato ritenuto opportuno seguire una denominazione che mantenga distinta la nomenclatura di queste diverse forme di <i>Juniperus</i> .	