


31.6 Cespuglieti e formazioni a megaforbie subalpine *Betulo-Adenostyletea*

Sono state considerate le due principali formazioni arbustive con un dettaglio del codice corine elevato poiché sono le uniche due tipologie italiane. Si tratta di formazioni subalpine dominate da arbusti e megaforbie. Le associazioni pure di megaforbie (31.63) sono difficilmente distinguibili e quindi vengono incluse nelle ontanete o nei saliceti arbustivi (a seconda del mosaico che formano).

CODICE CORINE BIOTOPES 31.611 ONTANETE AD <i>ALNUS VIRIDIS</i> DELLE ALPI	
EUNIS >F2.3	
SINTASSONOMIA <i>Alnetum viridis</i>	
DESCRIZIONE Si tratta di formazioni ben diffuse su tutte le Alpi su substrati non basici e generalmente in versanti freschi. Sotto l'ontano verde si sviluppa un compatto strato erbaceo con alte erbe e megaforbie.	
SOTTOCATEGORIE INCLUSE	
SPECIE GUIDA <i>Alnus viridis</i> (= <i>Alnus alnobetula</i>) (dominante o codominante), <i>Adenostyles alliariae</i> , <i>Crepis paludosa</i> , <i>Lactuca alpina</i> (= <i>Cicerbita alpina</i>), <i>Epilobium angustifolium</i> , <i>Senecio cacaliaster</i> .	
REGIONE BIOGEOGRAFICA Alpina	
PIANO ALTITUDINALE Montano, Subalpino	
DISTRIBUZIONE Alpi, Prealpi	
	
NOTE -	