


CODICE CORINE BIOTOPES 31.81 CESPUGLIETI MEDIO-EUROPEI	
EUNIS =F3.1	
SINTASSONOMIA <i>Berberidion</i>	
DESCRIZIONE Sono inclusi i cespuglieti a caducifoglie, sia dei suoli ricchi che dei suoli più superficiali della fascia collinare-montana delle latifoglie caducifoglie (querce, carpini, faggio, frassini, aceri). Queste formazioni, in origine mantelli dei boschi, sono oggi diffuse quali stadi di incespugliamento su pascoli abbandonati e in alcuni casi costituiscono anche siepi. Questi cespuglieti sulle Alpi sono diffusi dal piano collinare a quello montano mentre nell'Appennino ed in Sicilia sono esclusivi della fascia montana a contatto con i boschi di faggio.	
SOTTOCATEGORIE INCLUSE 31.811 Cespuglieti a <i>Prunus</i> e <i>Rubus</i> 31.812 Cespuglieti con <i>Berberis</i>	
SPECIE GUIDA <i>Amelanchier ovalis</i> , <i>Buxus sempervirens</i> , <i>Berberis vulgaris</i> , <i>Juniperus communis</i> , <i>Prunus malaheb</i> , <i>Rhamnus saxatilis</i> , <i>Rhamnus alpina</i> subsp. <i>fallax</i> , <i>Ribes uva-crispa</i> , <i>Rubus idaeus</i> , <i>Rosa montana</i> , <i>Rosa pouzinii</i> , <i>Rosa villosa</i> , <i>Viburnum opulus</i> accompagnate da specie dei Prunetalia spinosae quali <i>Prunus spinosa</i> , <i>Cornus sanguinea</i> , <i>Cornus mas</i> , <i>Crataegus monogyna</i> .	
REGIONE BIOGEOGRAFICA Mediterranea, Continentale, Alpina	
PIANO ALTITUDINALE Collinare, Montano	
DISTRIBUZIONE Intero territorio nazionale	
	
NOTE -	