

CODICE CORINE BIOTOPES 31.88 FORMAZIONI A <i>JUNIPERUS COMMUNIS</i>	
EUNIS =F3.1	DH = 5130
SINTASSONOMIA <i>Berberidion</i>	
DESCRIZIONE Si tratta di stadi di incespugliamento a <i>Juniperus communis</i> che si insediano su diverse tipologie di pascoli dei <i>Festuco-Brometea</i> . Si sviluppano dal piano collinare a quello montano. Al ginepro molto spesso si accompagnano le rose. Sono formazioni a nuclei separati che poi tendono a confluire. Vengono tenuti separati dal resto del <i>Berberidion</i> (a cui appartengono) perché sono gli unici dominati da conifere.	
SOTTOCATEGORIE INCLUSE -	
SPECIE GUIDA <i>Juniperus communis</i> (dominante o codominante) accompagnato da specie della categoria 31.81 quali: <i>Amelanchier ovalis</i> , <i>Buxus sempervirens</i> , <i>Berberis vulgaris</i> , <i>Prunus malaheb</i> , <i>Rhamnus saxatilis</i> , <i>Rhamnus alpina</i> subsp. <i>fallax</i> , <i>Rubus idaeus</i> , <i>Rosa sp. pl.</i>	
REGIONE BIOGEOGRAFICA Alpina, Continentale, Mediterranea	
PIANO ALTITUDINALE Collinare, Montano	
DISTRIBUZIONE Popolamenti a Ginepro comune sono segnalati in tutte le regioni italiane.	
	
NOTE Si può trovare in mosaico con 31.81.	