


| | |
|--|--|
| CODICE CORINE BIOTOPES 32.14 MATORRAL DI PINI | |
| EUNIS =F5.5 | |
| SINTASSONOMIA <i>Pistacio-Rhamnetalia</i> | |
| DESCRIZIONE Si tratta di formazioni in cui individui arborei formano una compagine più o meno densa al di sopra di macchie invece ben sviluppate. Si sviluppano nell'area mediterranea e sub-mediterranea. Si distinguono sulla base della specie arborea dominante (<i>Pinus pinaster</i> , <i>P. pinea</i> , <i>P. halepensis</i> , <i>P. brutia</i> , <i>P. gr. nigra</i> e <i>P. sylvestris</i>). | |
| SOTTOCATEGORIE INCLUSE 32.141 Matorral a <i>Pinus pinaster</i> 32.142 Matorral a <i>Pinus pinea</i> 32.143 Matorral a <i>Pinus halepensis</i> 32.144 Matorral a <i>Pinus brutia</i> 32.145 Matorral a <i>pino nero e pino silvestre</i> | |
| SPECIE GUIDA <i>Pinus pinaster</i> , <i>Pinus pinea</i> , <i>Pinus halepensis</i> , <i>Pinus brutia</i> , <i>Pinus nigra</i> , <i>Pinus sylvestris</i> . | |
| REGIONE BIOGEOGRAFICA Mediterranea | |
| PIANO ALTITUDINALE Planiziario, Collinare | |
| DISTRIBUZIONE Formazioni per lo più post-incendio di cui si trovano esempi molto significativi in Liguria. | |
|  | |
| NOTE - | |