

CODICE CORINE BIOTOPES <b>32.24 FORMAZIONI A PALMA NANA</b>	
EUNIS <b>=F5.54</b>	DH <b>&lt; 5330</b>
SINTASSONOMIA <b><i>Pistacio-Rhamnetalia</i></b>	
DESCRIZIONE Si tratta di macchie basse caratterizzate dalla presenza della palma nana ( <i>Chamaerops humilis</i> ), specie che raggiunge verso nord il litorale laziale. Sono formazioni sia xerofile primarie con <i>Juniperus phoenicea</i> subsp. <i>turbinata</i> sia di macchia secondaria di sostituzione ( <i>Pistacio-Chamaeropetum</i> ).	
SOTTOCATEGORIE INCLUSE -	
SPECIE GUIDA <i>Chamaerops humilis</i> (dominante e codominante), <i>Ceratonia siliqua</i> , <i>Juniperus phoenicea</i> subsp. <i>turbinata</i> , <i>Olea europaea</i> var. <i>sylvestris</i> , <i>Pistacia lentiscus</i> , <i>Sarcoptrum spinosum</i> , <i>Teucrium fruticans</i> (codominanti).	
REGIONE BIOGEOGRAFICA Mediterranea	
PIANO ALTITUDINALE Costiero, Planiziale, Collinare	
DISTRIBUZIONE Italia meridionale e Sicilia; Lazio (Quarto caldo del Promontorio del Circeo); Toscana (Argentario, monti dell'Uccellina, Arcipelago toscano, promontorio di Piombino).	
	
NOTE -	