


CODICE CORINE BIOTOPES 32.26 RETAMETI, FORMAZIONI A GENISTE TERMOMEDITERRANEE	
EUNIS =F5.56	DH < 5330
SINTASSONOMIA <i>Calicotomo villosae-Genistion tyrrhena</i>	
DESCRIZIONE Si tratta di formazioni termomediterranee caratterizzate dalla dominanza di leguminose arbustive: sono inclusi aspetti predesertici a <i>Retama raetam</i> (32.268), quelli rupestri vulcanici endemici delle Eolie a <i>Cytisus eolicus</i> (32.269) e quelli insulari a <i>Genista ephedroides</i> (32.26A).	
SOTTOCATEGORIE INCLUSE 32.268 Retameto delle coste siciliane 32.269 Retameti delle isole eolie 32.26A Formazioni a <i>Genista ephedroides</i>	
SPECIE GUIDA <i>Genista ephedroides</i> , <i>Genista tyrrhena</i> , <i>Cytisus eolicus</i> (Eolie), <i>Genista aspalathoides</i> (Pantelleria), <i>Retama raetam subs. gussonei</i> , <i>Calicotome villosa</i> .	
REGIONE BIOGEOGRAFICA Mediterranea	
PIANO ALTITUDINALE Costiero, Planiziale	
DISTRIBUZIONE Campania (Cilento, tra Marina di Ascea e Pisciotta, SA), Calabria (Punta Alice, KR), Sicilia, Isole Eolie.	
	
NOTE Spesso non cartografabili per le ridotte estensioni o perché a mosaico con altre formazioni.	