


<b>CODICE CORINE BIOTOPES</b> <b>32.4 GARIGHE E MACCHIE MESOMEDITERRANEE CALCICOLE</b>	
<b>EUNIS</b> <b>=F6.1</b>	
<b>SINTASSONOMIA</b> <b>Rosmarino-Ericion multiflorae</b>	
<b>DESCRIZIONE</b> Valgono in generale le considerazioni fatte per le macchie silicicole. Gravitano nettamente nella fascia mesomediterranea e rappresentano formazioni secondarie legate al <i>Quercion ilicis</i> . La suddivisione interna si basa su caratteri strutturali difficilmente utilizzabili in cartografia (macchie alte e macchie basse) e sulla composizione dominante (cisti vs erica). Possono infatti dominare labiate ( <i>Rosmarinus officinalis</i> , <i>Lavandula</i> , <i>Thymus</i> , <i>Salvia officinalis</i> , <i>Micromeria</i> e <i>Satureja</i> ), cisti ( <i>Cistus creticus</i> <i>l.s.</i> ), <i>Euphorbia spinosa</i> , ginepri prostrati ( <i>Juniperus oxycedrus</i> ), <i>Genista corsica</i> (però per lo più da riferire al 32.7), <i>Calicotome</i> (solo gli aspetti meso- e supramediterranei), varie composite ( <i>Dittrichia viscosa</i> , <i>Santolina</i> , <i>Helychrisum</i> ), <i>Erica multiflora</i> , <i>Globularia alypum</i> , <i>Helianthemum</i> e <i>Fumana</i> . Data la posizione sindinamica e la difficoltà di distinguere certe sottocategorie si ritiene opportuno considerare solo il livello gerarchico più alto della classificazione Corine Biotopes.	
<b>SOTTOCATEGORIE INCLUSE</b>	
32.42 Formazioni a <i>Rosmarinus officinalis</i>	32.43 Garighe a <i>Cistus</i>
32.44 Garighe a <i>Euphorbia</i>	32.45 Garighe a ginepri prostrati
32.46 Garighe a <i>Lavanda</i>	32.47 Garighe a timo, salvia e altre labiate
32.48 Garighe a genista	32.49 Garighe a <i>Calicotome</i>
32.4A Garighe composite	32.4A1 Garighe a <i>Helichrysum</i> o <i>Santolina</i>
32.4B Garighe ad erica	32.4C Garighe a <i>Globularia alypum</i>
32.4 D Garighe a <i>Helianthemum</i> o <i>Fumana</i>	
<b>SPECIE GUIDA</b> <i>Cistus albidus</i> , <i>Cistus creticus</i> subsp. <i>eriocephalus</i> , <i>Cistus clusii</i> , <i>Dorycnium pentaphyllum</i> , <i>Erica multiflora</i> , <i>Fumana ericoides</i> subsp. <i>ericoides</i> , <i>Fumana thymifolia</i> , <i>Globularia alypum</i> , <i>Helianthemum caput-felis</i> , <i>Micromeria microphylla</i> , <i>Osyris alba</i> , <i>Rosmarinus officinalis</i> , <i>Santolina etrusca</i> , <i>Teucrium polium</i> , <i>Thymelaea hirsuta</i> , <i>Thymus sp.pl.</i>	
<b>REGIONE BIOGEOGRAFICA</b> Mediterranea	
<b>PIANO ALTITUDINALE</b> Costiero, Planiziale, Collinare	
<b>DISTRIBUZIONE</b> Liguria, Toscana, Lazio, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia	
	
<b>NOTE</b> -	