

34.32 Praterie calcaree subatlantiche semiaride

Si tratta di pascoli semi-aridi dominati da *Bromus erectus* e/o *Brachypodium rupestre* e *B. caespitosum*. Sono diffusi prevalentemente sul margine centro-occidentale delle Alpi e sugli appennini (sostituiti dagli *Scorzoneretalia* nell'Italia più orientale). Si tratta di pascoli secondari di sostituzione dei boschi a latifoglie submediterranei mesofili e del piano collinare-montano.

CODICE CORINE BIOTOPES 34.323 PRATERIE XERICHE DEL PIANO COLLINARE, DOMINATE DA <i>BRACHYPODIUM RUPESTRE</i>, <i>B. CAESPITOSUM</i>	
EUNIS =E1.2	DH < 6210 PRIORITARIO se: * stupenda fioritura di orchidee
SINTASSONOMIA <i>Phleion ambigu-Bromenion erecti</i>	
DESCRIZIONE Formazioni dominate da <i>Brachypodium rupestre</i> o <i>Brachypodium caespitosum</i> che sono diffuse nella fascia collinare su suoli primitivi nell'Appennino.	
SOTTOCATEGORIE INCLUSE -	
SPECIE GUIDA <i>Brachypodium rupestre</i> , <i>Brachypodium phoenicoides</i> , <i>Brachypodium caespitosum</i> , <i>Stipa sp. pl.</i> , (dominanti) <i>Bromus erectus</i> , <i>Dorycnium pentaphyllum</i> , <i>Festuca circummediterranea</i> (codominanti), <i>Anthyllis vulneraria</i> , <i>Galium lucidum</i> , <i>Helianthemum nummularium</i> , <i>Koeleria splendens</i> , <i>Ononis spinosa</i> , <i>Sideritis syriaca</i> , <i>Thymus longicaulis</i> (frequenti).	
REGIONE BIOGEOGRAFICA Mediterranea, Continentale	
PIANO ALTITUDINALE Collinare, Montano	
DISTRIBUZIONE Liguria, Emilia Romagna, Abruzzo, Umbria, Marche, Toscana, Lazio, Molise, Puglia, Campania, Basilicata. Popolamenti di limitate estensioni sono segnalati anche in Veneto e Val d'Aosta nel piano collinare.	
	
NOTE -	