

CODICE CORINE BIOTOPES 34.75 PRATI ARIDI SUB-MEDITERRANEI ORIENTALI	
EUNIS =E1.5	DH = 62A0
SINTASSONOMIA Scorzoneretalia	
DESCRIZIONE A questa categoria viene dato un significato ampio in quanto tutti i recenti studi hanno confermato la penetrazione dei pascoli a carattere illirico lungo il margine meridionale delle Alpi su substrati calcarei. Questa diffusione è certa fino all'area insubrica. Per questo tutte le praterie xeriche e mesoxeriche dei <i>Festuco-Brometea</i> di questi territori vanno riferite a questa tipologia.	
SPECIE GUIDA <i>Bromus condensatus</i> , <i>Bromus erectus</i> , <i>Chrysopogon gryllus</i> <i>Globularia cordifolia</i> , <i>Stipa eriocalis</i> (dominanti), <i>Centaurea jacea</i> subsp. <i>angustifolia</i> , <i>Cirsium pannonicum</i> , <i>Cytisus pseudoprocumbens</i> , <i>Danthonia alpina</i> , <i>Genista sericea</i> , <i>Inula ensifolia</i> , <i>Knautia illyrica</i> , <i>Knautia ressmannii</i> , <i>Polygala nicaeensis</i> subsp. <i>carniolica</i> , <i>Scorzonera austriaca</i> , <i>Scorzonera villosa</i> (caratteristiche), <i>Carex montana</i> , <i>Crepis dinarica</i> , <i>Jurinea mollis</i> , <i>Matthiola fruticulosa</i> , <i>Peucedanum cervaria</i> , <i>Peucedanum oreoselinum</i> .	
REGIONE BIOGEOGRAFICA Continentale	
PIANO ALTITUDINALE Collinare, Montano	
DISTRIBUZIONE Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Lombardia (area insubrica)	
	
NOTE Le praterie fino all'area dei laghi lombardi (34.327 Praterie insubriche) sono state inserite qui.	