


| | |
|--|--|
| CODICE CORINE BIOTOPES 35.3 PRATELLI SILICICOLI MEDITERRANEI | |
| EUNIS =E1.8 | DH < 6220 PRIORITARIO |
| SINTASSONOMIA <i>Tuberarietalia guttatae</i> | |
| DESCRIZIONE Si tratta di praterelli effimeri acidofili e di suoli poveri, dominati da specie annuali a ciclo invernale-primaverile. Sono ben diffusi nei territori mediterranei su suoli a forte disseccamento estivo, di tipo sabbioso e argilloso. | |
| SOTTOCATEGORIE INCLUSE - | |
| SPECIE GUIDA <i>Aira caryophyllea</i> subsp. <i>caryophyllea</i> , <i>Aira cupaniana</i> , <i>Aira elegantissima</i> , <i>Cerastium pumilum</i> , <i>Corynephorus divaricatus</i> , <i>Hymenocarpus circinnatus</i> , <i>Moenchia erecta</i> , <i>Filago gallica</i> , <i>Ornithopus compressus</i> , <i>Ornithopus perpusillus</i> , <i>Ornithopus pinnatus</i> , <i>Paronychia echinulata</i> , <i>Rumex bucephalophorus</i> , <i>Teesdalia coronopifolia</i> , <i>Tillaea muscosa</i> , <i>Tolpis umbellata</i> , <i>Trifolium arvense</i> , <i>Trifolium glomeratum</i> , <i>Trisetaria michelii</i> , <i>Tuberaria guttata</i> , <i>Vulpia bromoides</i> , <i>Vulpia myuros</i> , <i>Vulpia geniculata</i> , <i>Vulpia muralis</i> | |
| REGIONE BIOGEOGRAFICA Mediterranea | |
| PIANO ALTITUDINALE Costiero, Planiziale, Collinare | |
| DISTRIBUZIONE Lazio, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia | |
|  | |
| NOTE Raramente cartografabili, solitamente a mosaico con le macchie acidofile (32.3) o al margine di cistete e sugherete. | |