


Codice Corine Biotopes 37.31 PRATI UMIDI SU SUOLI CON RISTAGNO D'ACQUA	
EUNIS =E3.5	DH = 6410
SINTASSONOMIA <i>Molinion</i>	
DESCRIZIONE Si tratta di formazioni prative dominate da <i>Molinia caerulea</i> che si instaurano su suoli a buona disponibilità idrica. Sono presenti in tutta l'Italia settentrionale e nelle fasce superiori di quella peninsulare. Sono associazioni secondarie create dall'uomo per disboscamento di boschi umidi. Sono ridotte a pochi lembi e spesso incespugliate. Si possono insediare sia su suoli minerali che torbosi, a reazione basica (37.311) o acida (37.312).	
SOTTOCATEGORIE INCLUSE 37.311 Molinieti calcifili 37.312 Molinieti acidofili	
SPECIE GUIDA <i>Molinia caerulea</i> (dominante o codominante), <i>Carex panicea</i> , <i>Deschampsia caespitosa</i> , <i>Deschampsia flexuosa</i> , <i>Caltha palustris</i> , <i>Carex tomentosa</i> , <i>Juncus subnodulosus</i> (codominanti), <i>Cirsium tuberosum</i> , <i>Gladiolus palustris</i> , <i>Galium boreale</i> , <i>Gentiana pneumonanthe</i> , <i>Gratiola officinalis</i> , <i>Laserpitium prutenicum</i> , <i>Ophioglossum vulgatum</i> , <i>Plantago altissima</i> , <i>Selinum carvifolia</i> , <i>Silaum silaus</i> , <i>Succisa pratensis</i> , <i>Trifolium patens</i> (caratteristiche), <i>Hypericum tetrapterum</i> , <i>Inula salicina</i> , <i>Ranunculus flammula</i> , <i>Silene flos-cuculi</i> , <i>Stachys officinalis</i> , <i>Trifolium dubium</i> , (frequenti).	
REGIONE BIOGEOGRAFICA Continentale, Mediterranea, Alpina	
PIANO ALTITUDINALE Montano, Subalpino	
DISTRIBUZIONE Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Toscana	
	
NOTE -	