

<b>CODICE CORINE BIOTOPES</b> <b>41.281 QUERCO-CARPINETI DEI SUOLI IDROMORFI CON Q. ROBUR</b>	
<b>EUNIS</b> <b>=G1.A</b>	<b>DH</b> <b>&gt; 9160</b> <b>&gt; 91L0 (Alpi orientali)</b>
<b>SINTASSONOMIA</b> <b><i>Erythronio-Carpinion betuli</i>, <i>Carpinion betuli</i></b>	
<b>DESCRIZIONE</b> <p>Si tratta di boschi che si sviluppano su suoli idromorfi con falda freatica molto superficiale. Erano diffusi nelle grandi pianure (boschi planiziali) e in alcuni fondovalle prealpini, ma oggi sono limitati a pochi lembi di enorme valore naturalistico. In realtà quelli della pianura veneto-friulana sono riferiti all'alleanza illirica <i>Erythronio-Carpinion</i>, quelli più occidentali al <i>Carpinion</i>. Sono dominati da <i>Quercus robur</i> e <i>Carpinus betulus</i> a cui si può accompagnare <i>Fraxinus angustifolia</i>. Sono incluse anche le rare formazioni peninsulari dominate da <i>Q. robur</i> e <i>Carpinus betulus</i>.</p>	
<b>SOTTOCATEGORIE INCLUSE</b> -	
<b>SPECIE GUIDA</b> <i>Quercus robur</i> , <i>Carpinus betulus</i> (dominanti), <i>Fraxinus angustifolia</i> , <i>Quercus petraea</i> , <i>Tilia cordata</i> , <i>Tilia platyphyllos</i> (codominanti), <i>Asparagus tenuifolius</i> (differenziale rispetto a 41.282).	
<b>REGIONE BIOGEOGRAFICA</b> Continentale	
<b>PIANO ALTITUDINALE</b> Planiziale, Collinare, Montano	
<b>DISTRIBUZIONE</b> Piemonte, Lombardia, pianura Friulano-Veneta, presenze puntiformi in Liguria, Marche, Toscana, Lazio, Umbria.	
	
<b>NOTE</b> Si tratta di una sottocategoria creata ad hoc per la cartografia degli habitat italiani alla scala 1:50000.	