


### 41.3 *Boschi di frassino maggiore*

Questa categoria viene introdotta con un significato ampliato rispetto al manuale Corine. Infatti esso raggruppa nel 41.3 solo boschi a forte impronta atlantica

CODICE CORINE BIOTOPES <b>41.39 FORMAZIONI POSTCOLTURALI A FRASSINO MAGGIORE E NOCCIOLO</b>	
EUNIS <b>= G1.A</b>	
SINTASSONOMIA <b><i>Fagetalia p.p.</i></b>	
DESCRIZIONE Vengono qui incluse le formazioni dominate da frassino maggiore ( <i>Fraxinus excelsior</i> ) e acero di monte ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ), ben diffuse sulle Alpi e sviluppatesi quasi sempre per abbandono di pascoli su suoli evoluti. Si tratta di strutture anche disomogenee che sono rappresentate da alti arbusteti, pre boschi e boschi maturi.	
SOTTOCATEGORIE INCLUSE -	
SPECIE GUIDA <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Acer pseudoplatanus</i> , <i>Corylus avellana</i> (dominanti), <i>Asarum europaeum</i> , <i>Allium ursinum</i> , <i>Circaea lutetiana</i> , <i>Clematis vitalba</i> , <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Rosa sp.pl.</i> , <i>Rubus sp.pl.</i> , <i>Galanthus nivalis</i> , <i>Vinca minor</i> .	
REGIONE BIOGEOGRAFICA Continentale	
PIANO ALTITUDINALE Collinare, Montano	
DISTRIBUZIONE Alpi, Prealpi	
	
NOTE -	