


41.4 Foreste miste di forra

CODICE CORINE BIOTOPES 41.41 BOSCHI MISTI DI FORRE E SCARPATE	
EUNIS G1.A	DH < 9180 Prioritario
SINTASSONOMIA <i>Tilio-Acerion (Arunco-Aceretum, Asaro-Fagetum, Cirsio erisithali-Ulmetum, Hacquetio-Fraxinetum)</i>	
DESCRIZIONE Si tratta di formazioni ricche in latifoglie che si sviluppano nelle forre con elevata umidità atmosferica. Sono diffuse nei sistemi prealpini esterni e nell'Appennino. Sono dominate da <i>Acer pseudoplatanus</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Tilia platyphyllos</i> , <i>Ulmus glabra</i> e il sottobosco è ricco di geofite e specie caratteristiche come <i>Lunaria rediviva</i> . In questa categoria vengono incluse sia le formazioni pedemontane che quelle di quote maggiori (riferibili per lo più al 41.43).	
SOTTOCATEGORIE INCLUSE -	
SPECIE GUIDA <i>Acer platanoides</i> , <i>Acer pseudoplatanus</i> , <i>Betula pendula</i> , <i>Carpinus betulus</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Populus tremula</i> , <i>Tilia platyphyllos</i> , <i>Ulmus glabra</i> , <i>Ulmus minor</i> , <i>Ulmus glabra</i> (dominanti), <i>Fagus sylvatica</i> , <i>Ostrya carpinifolia</i> , <i>Tilia cordata</i> (codominanti), <i>Actea spicata</i> , <i>Aruncus dioicus</i> , <i>Lamiastrum galeobdolon</i> subsp. <i>flavidum</i> , <i>Lamium orvala</i> , <i>Lunaria rediviva</i> , <i>Phyllitis scolopendrium</i> (caratteristiche), <i>Cyclamen purpurascens</i> , <i>Dryopteris filix-mas</i> , <i>Luzula nivea</i> , <i>Melampyrum pratense</i> , <i>Solidago virgaurea</i> (altre specie significative).	
REGIONE BIOGEOGRAFICA Continentale	
PIANO ALTITUDINALE Collinare, Montano	
DISTRIBUZIONE Prealpi, Appennino	
	
NOTE -	