

| | |
|--|--|
| CODICE CORINE BIOTOPES 41.D1 FORMAZIONI A PIOPPO TREMULO E BETULLA | |
| EUNIS =G1.9 | |
| SINTASSONOMIA <i>Corylo-Populion</i> | |
| DESCRIZIONE Si tratta di formazioni prenemorali costituite principalmente da <i>Populus tremula</i> a cui si accompagnano spesso <i>Betula pendula</i> e <i>Corylus avellana</i> . Sono diffuse nelle vallate alpine più secche e vi sono anche aspetti simili sia nelle Prealpi calcaree che nell'Appennino. | |
| SOTTOCATEGORIE INCLUSE - | |
| SPECIE GUIDA <i>Betula pendula</i> , <i>Populus tremula</i> (dominanti), <i>Corylus avellana</i> (codominante), <i>Phillytis scolopendrium</i> , <i>Polystichum setiferum</i> , <i>Sambucus nigra</i> (altre specie significative). | |
| REGIONE BIOGEOGRAFICA Mediterranea, Continentale | |
| PIANO ALTITUDINALE Collinare, Montano | |
| DISTRIBUZIONE Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Abruzzo. | |
|  | |
| NOTE - | |