

CODICE CORINE BIOTOPES 42.21 PECCETE SUBALPINE	
EUNIS =G3.1	DH < 9410
SINTASSONOMIA <i>Larici-Piceetum</i>, <i>Adenostylo glabrae-Piceetum</i>, <i>Asplenio-Piceetum</i>, <i>Homogyno-Piceetum</i>	
DESCRIZIONE Si tratta delle peccete che si sviluppano nel piano subalpino ed in buona parte del sistema Alpino rappresentano i boschi terminali. In realtà sono costituite da consorzi forestali che con la quota si aprono lasciando entrare molti cespuglieti nani come rododendri etc. e si arricchiscono molto di larice. Infatti le peccete subalpine sono spesso consorzi misti di <i>Picea abies</i> e <i>Larix decidua</i> e quest'ultima specie, nei popolamenti giovani e meno strutturati, può anche essere dominante. Sono incluse le formazioni tipiche con sottobosco rado a mirtilli (42.211) quelle con megaforie dei suoli profondi e versanti freschi (42.212), quelle su suoli torbosi (42.213) e le peccete d'inversione termica presenti nel piano montano ma con flora caratteristica del piano subalpino (42.214).	
SOTTOCATEGORIE INCLUSE 42.211 Pecceta subalpina (<i>Homogyno-Piceetum</i>) 42.212 Peccete a megaforie 42.213 Peccete su torba 42.214 Peccete di inversione termica	
SPECIE GUIDA <i>Picea abies</i> (dominante), <i>Abies alba</i> , <i>Larix decidua</i> , <i>Pinus cembra</i> (codominanti), <i>Adenostyles glabrae</i> , <i>Arnica montana</i> , <i>Campanula barbata</i> , <i>Nardus stricta</i> , <i>Pinus mugo</i> , <i>Rhododendron ferrugineum</i> (differenziali), <i>Avenella flexuosa</i> , <i>Daphne mezereum</i> , <i>Homogyne alpina</i> , <i>Laburnum alpinum</i> , <i>Oxalis acetosella</i> , <i>Sorbus aria</i> , <i>Vaccinium myrtillus</i> , <i>Vaccinium vitis-idaea</i> .	
REGIONE BIOGEOGRAFICA Alpina, Continentale	
PIANO ALTITUDINALE Subalpino	
DISTRIBUZIONE Alpi, Prealpi 	
NOTE -	