


CODICE CORINE BIOTOPES	
<b>42.31 BOSCHI ACIDOFILI DI CEMBRO E LARICE DELLE ALPI ORIENTALI</b>	
EUNIS <b>=G3.2</b>	DH <b>&lt; 9420</b>
SINTASSONOMIA <b>Larici-Pinetum cembrae (Piceion excelsae)</b>	
DESCRIZIONE Non vengono considerati i lariceti puri su acido che rappresentano facies fisionomiche della pecceta subalpina ( <i>Larici-Piceetum</i> ). Sono boschi aperti, con sottobosco dominato da cespugli nani di ericacee; si sviluppano nella fascia subalpina delle Alpi interne dalle Dolomiti verso occidente. Sono incluse diverse categorie distinte su base ecologica: cembrete dei pendii (42.312), aspetti più aperti con molte specie della brughiera subalpina (42.313), foreste dominate dal larice con nuclei di cembro (42.314), aspetti xerofili con <i>Pinus mugo</i> (42.315) o con <i>Arctostaphylos uva-ursi</i> (42.316), aspetti mesofili con <i>Alnus viridis</i> (42.317), aspetti dei grandi massi stabilizzati con licheni (42.318) e aspetti dei suoi torbosi (42.319).	
SOTTOCATEGORIE INCLUSE 42.312 Cembrete dense di pendio 42.313 Larici-cembrete aperti con numerose specie di brughiera 42.314 Lariceti con nuclei di cembro 42.315 Larici-cembrete xerofili con <i>Pinus mugo</i> 42.316 Larici-cembrete xerofili con <i>Arctostaphylos uva-ursi</i> 42.317 Larici-cembrete mesici con <i>Alnus viridis</i> 42.318 Larici-cembrete dei grandi massi stabilizzati 42.319 Larici-cembrete dei suoli torbosi	
SPECIE GUIDA <i>Pinus cembra</i> , <i>Larix decidua</i> (dominanti), <i>Arctostaphylos uva-ursi</i> , <i>Calamagrostis villosa</i> , <i>Erica carnea</i> , <i>Picea abies</i> , <i>Rhododendron ferrugineum</i> , <i>Vaccinium myrtillus</i> , <i>Vaccinium vitis-idaea</i> (co-dominanti), <i>Linnaea borealis</i> , <i>Listera cordata</i> , <i>Luzula luzulina</i> , <i>Moneses uniflora</i> (caratteristiche), <i>Alnus viridis</i> , <i>Luzula albida</i> .	
REGIONE BIOGEOGRAFICA Alpina	
PIANO ALTITUDINALE Subalpina	
DISTRIBUZIONE Piemonte, Alpi orientali	
	
NOTE -	