


## 42.A Cipresseti, ginepreti e formazioni a tasso

Formazioni rare e localizzate. Le categorie 42.A9 (Formazioni a *Juniperus oxycedrus*) e 42.AA Boscaglia a Ginepro fenicio (*Oleo-Juniperetum phoeniceae*) sono state riferite al corrispondente matorral 32.131 anche i rari casi di formazioni più arboreescenti.

CODICE CORINE BIOTOPES <b>42.A7 BOSCHI CON TASSO</b>	
EUNIS <b>=G3.9</b>	DH <b>= 9580</b> <b>Prioritario</b>
SINTASSONOMIA <b><i>Oleo-Ceratonion</i></b>	
DESCRIZIONE <i>Taxus baccata</i> in Italia è diffuso nelle faggete basofile riferibili per lo più a 41.175, 41.18 e agli orno-ostryeti (41.81). Raramente forma popolamenti puri in facies di mantello e talora si accompagna con <i>Ilex aquifolium</i> e <i>Buxus sempervirens</i> . In questo caso si tratta di formazioni dominate da <i>Taxus baccata</i> accompagnato sempre da <i>Ilex aquifolium</i> che si sviluppano in particolari condizioni di umidità atmosferica. Sono incluse le formazioni Sarde (42.A73) e quelle dell'Italia centrale (42.A74).	
SOTTOCATEGORIE INCLUSE 42.A73 Boschi di tasso della Sardegna 42.A74 Boschi di tasso dell'Italia peninsulare	
SPECIE GUIDA <i>Taxus baccata</i> , <i>Ilex aquifolium</i> , <i>Buxus sempervirens</i>	
REGIONE BIOGEOGRAFICA Mediterranea	
PIANO ALTITUDINALE Montano	
DISTRIBUZIONE Basilicata, Molise, Abruzzo, Sardegna (monte Lattias, monte Rasu, monti del Gennargentu, monte Limbara, Mandrolisai, Marghine-Goceano, Montiferru, Ogliastra, Montalbo), Sicilia (Nebrodi).	
	
NOTE -	