


CODICE CORINE BIOTOPES <b>44.11 CESPUGLIETI DI SALICI PRE-ALPINI</b>	
EUNIS =F9.1	DH < 3230 (sottocategoria 44.111) < 3240 (sottocategoria 44.112)
SINTASSONOMIA <b><i>Salicion eleagno-daphnoides</i></b>	
DESCRIZIONE Si tratta delle formazioni dominate da salici arbustivi che si sviluppano lungo i greti dei torrenti e dei grandi fiumi. Occupano la porzione di letto solo periodicamente interessato dalle piene, Sono dominati da <i>Salix eleagnos</i> e <i>Salix purpurea</i> , che possono anche mescolarsi a <i>Myricaria germanica</i> su depositi temporanei di sabbie fini (44.111) e a <i>Hippophaë fluviatilis</i> su banchi sabbiosi rilevati. Sono escluse le formazioni di plantule di salici o con salici sparsi, riferibili alla vegetazione dei greti. Sono limitati al margine meridionale delle Alpi e quello settentrionale degli Appennini.	
SOTTOCATEGORIE INCLUSE 44.111 Cespuglieti con salici e <i>Myricaria germanica</i> 44.112 Cespuglieti con salici e <i>Hippophaë fluviatilis</i>	
SPECIE GUIDA <i>Salix eleagnos</i> , <i>Salix purpurea</i> , <i>Salix incana</i> , <i>Salix triandra</i> (dominanti), <i>Alnus incana</i> , <i>Frangula alnus</i> (codominanti), <i>Myricaria germanica</i> , <i>Hippophaë fluviatilis</i> , <i>Calamagrostis pseudophragmites</i> (caratteristiche), <i>Calamagrostis epigejos</i> , <i>Gallium mollugo</i> , <i>Tussilago farfara</i> , <i>Urtica dioica</i> (altre specie significative).	
REGIONE BIOGEOGRAFICA Alpina, Continentale	
PIANO ALTITUDINALE Montano	
DISTRIBUZIONE Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Veneto, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Toscana, Emilia Romagna, Marche.	
	
NOTE -	