

44.3 Boschi medioeuropei ripariali a frassini e ontani

CODICE CORINE BIOTOPES 44.31 ALNO-FRASSINETI DEI RIVI E SORGENTI	
EUNIS =G1.2	DH < 91EO Prioritario
SINTASSONOMIA <i>Carici remotae-Fraxinetum</i>	
DESCRIZIONE Formazioni di dimensioni spesso limitate, presenti sulle Alpi lungo corsi d'acqua minori o a ridosso di aree umide. Sono inclusi numerosi sottotipi ecologici di difficile distinzione: formazioni a <i>Fraxinus excelsior</i> ed <i>Alnus glutinosa</i> ricche in carici (44.31), formazioni delle sorgenti con <i>Cardamine amara</i> , formazioni a megaforie con <i>Eupatorium cannabinum</i> (44.33), formazioni su calcare con <i>Equisetum telmateia</i> (= <i>Equisetum telmateja</i>) (44.3159).	
SOTTOCATEGORIE INCLUSE 44.311 Frassineti con <i>Alnus glutinosa</i> e carici 44.312 Frassineti con <i>Alnus glutinosa</i> delle sorgenti 44.313 Frassineti con <i>Alnus glutinosa</i> e megaforie 44.315 Frassineti con <i>Alnus glutinosa</i> ed <i>Equisetum telmateia</i>	
SPECIE GUIDA <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Alnus glutinosa</i> (dominanti), <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus minor</i> (codominanti), <i>Cardamine amara</i> , <i>Carex remota</i> , <i>Hydrocotyle vulgaris</i> (caratteristiche), <i>Carex hirta</i> , <i>Carex sylvatica</i> , <i>Crataegus laevigata</i> , <i>Eupatorium cannabinum</i> , <i>Equisetum telmateia</i> , <i>Hedera helix</i> , <i>Lysimachia nummularia</i> (altre specie significative).	
REGIONE BIOGEOGRAFICA Mediterranea, Continentale	
PIANO ALTITUDINALE Planiziale, Collinare	
DISTRIBUZIONE Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana	
	
NOTE -	