


CODICE CORINE BIOTOPES <b>44.63 FORESTE MEDITERRANEE RIPARIALI A FRASSINO</b>	
EUNIS <b>=G1.3</b>	DH <b>&lt; 92A0</b>
SINTASSONOMIA <b><i>Carici-Fraxinetum, Ranunculo-Fraxinetum, Fraxino-Quercetum robori</i></b>	
DESCRIZIONE Formazioni dominate da <i>Fraxinus angustifolia</i> che si sviluppano su suoli meno ricchi e inondazioni meno pronunciate rispetto ai populeti a <i>Populus alba</i> . Sono diffuse in modo sporadico in tutta la penisola. Al frassino si mescolano spesso <i>Alnus glutinosa</i> e/o <i>Quercus robur</i> . Sono qui inclusi i boschi dell' <i>Osmundo Alnion glutinosae</i> (44.51).	
SOTTOCATEGORIE INCLUSE 44.634 Boscaglie tirreniche a galleria di frassino e ontano 44.635 Gallerie italiane ad ontani	
SPECIE GUIDA <i>Fraxinus angustifolia</i> , <i>Alnus glutinosa</i> (dominanti), <i>Quercus robur</i> (codominante), <i>Carex remota</i> , <i>Osmunda regalis</i> (caratteristiche), <i>Aegopodium podagraria</i> , <i>Carex pendula</i> , <i>Cornus sanguinea</i> , <i>Humulus lupulus</i> , <i>Ranunculus ficaria</i> , <i>Rubus caesius</i> , <i>Solanum dulcamara</i> (altre specie significative).	
REGIONE BIOGEOGRAFICA Continentale, Mediterranea	
PIANO ALTITUDINALE Planiziale, Collinare	
DISTRIBUZIONE Piemonte, Liguria e Italia peninsulare	
	
NOTE -	