

44.8 Foreste e cespuglieti ripariali meridionali

| | |
|---|---------------------|
| CODICE CORINE BIOTOPES 44.81 GALLERIE A TAMERICE E OLEANDRI | |
| EUNIS =F9.3 | DH = 92D0 |
| SINTASSONOMIA <i>Rubo-Nerion oleandri, Tamaricion africanae</i> | |
| DESCRIZIONE Si tratta delle formazioni arbustive che si sviluppano lungo i corsi d'acqua temporanei dell'Italia meridionale su ghiaie e su limi. Sono caratterizzate da <i>Nerium oleander</i> , <i>Vitex agnus-castus</i> e numerose specie di <i>Tamarix</i> . A seconda della dominanza di una delle tre specie si individuano le sottocategorie. | |
| SOTTOCATEGORIE INCLUSE 44.811 Boscaglie a galleria di oleandri 44.812 Boscaglie a <i>Vitex agnus-castus</i> 44.813 Cespuglieti di tamerici | |
| SPECIE GUIDA <i>Nerium oleander</i> , <i>Vitex agnus-castus</i> , <i>Tamarix africana</i> , <i>Tamarix gallica</i> (dominanti), <i>Rubus ulmifolius</i> . | |
| REGIONE BIOGEOGRAFICA Mediterranea | |
| PIANO ALTITUDINALE Costiero, Planiziale, Collinare | |
| DISTRIBUZIONE Calabria, Sardegna, Sicilia | |
|  | |
| NOTE - | |