

44.9 *Boschi torbosi a ontano e salici*

CODICE CORINE BIOTOPES 44.91 BOSCHI PALUSTRI DI ONTANO NERO E SALICE CINERINO	
EUNIS >G1.4	DH < 91E0
SINTASSONOMIA <i>Alnetea glutinosae</i>	
DESCRIZIONE Si tratta di boschi igrofilo dominati da <i>Alnus glutinosa</i> che si instaurano su suoli sia minerali che torbosi, caratterizzati da un'imbibizione quasi perenne e da scarsa disponibilità di ossigeno. Vanno qui riferiti anche i cespuglieti ad <i>Salix cinerea</i> . Sono diffusi in modo puntiforme in tutto il territorio nazionale e sono articolati in ontanete meso-eutrofiche (44.911), oligotrofiche (44.912) e boschi dell'area mediterranea (44.913).	
SOTTOCATEGORIE INCLUSE 44.911 Ontanete meso-eutrofici 44.912 Ontanete oligotrofici 44.913 Ontanete dell'Italia meridionale	
SPECIE GUIDA <i>Alnus glutinosa</i> , <i>Salix cinerea</i> (dominanti), <i>Frangula alnus</i> , <i>fraxinus excelsior</i> , <i>Sambucus nigra</i> (codominanti), <i>Carex elongata</i> (caratteristica), <i>Angelica sylvestris</i> , <i>Caltha palustris</i> , <i>Cirsium palustris</i> , <i>Deschamsia caespitosa</i> , <i>Equisetum palustre</i> , <i>Galeopsis tetrahit</i> , <i>Glechoma hederacea</i> , <i>Rubus caesius</i> , <i>Solanum dulcamara</i> , <i>Viburnum opulus</i> (altre specie significative).	
REGIONE BIOGEOGRAFICA Continentale	
PIANO ALTITUDINALE Planiziale, Collinare	
DISTRIBUZIONE Intero territorio	
	
NOTE -	