


## 54 Paludi, torbiere di transizione e sorgenti

CODICE CORINE BIOTOPES <b>54.2 PALUDI NEUTRO-BASIFILE</b>	
EUNIS <b>=D4.1</b>	DH <b>= 7230</b>
SINTASSONOMIA <b><i>Caricetalia davallianae</i></b>	
DESCRIZIONE Si tratta di paludi e torbiere basse (soligeno-topogeno) che si sviluppano in diversi piani altitudinali, su substrati di origine calcarea. A questa categoria appartengono habitat che, tranne alle alte quote, sono relittici e per questo, ove possibile, da cartografare. Dominano <i>Schoenus nigricans</i> (54.21) concentrato nella pianura e nei territori più caldi, <i>Schoenus ferrugineus</i> (54.22), distribuito nelle vallate alpine, <i>Carex davalliana</i> (54.23) di molte torbiere montane, <i>Carex frigida</i> (54.28) dei pendii rupestri, <i>Carex rostrata</i> (54.2C) delle cinture esterne delle torbiere. Sono incluse anche le torbiere invecchiate invase da alte erbe (54.2I).	
SOTTOCATEGORIE INCLUSE 54.21 Paludi a <i>Schoenus nigricans</i> 54.22 Paludi a <i>Schoenus ferrugineus</i> 54.23 Formazioni dominate da <i>Carex davalliana</i> 54.28 Formazioni a <i>Carex frigida</i> 54.2C Formazioni a <i>Carex rostrata</i> 54.2I Paludi invase da alte erbe	
SPECIE GUIDA <i>Carex davalliana</i> , <i>Carex frigida</i> , <i>Carex rostrata</i> , <i>Epipactis palustris</i> , <i>Orchis laxiflora</i> , <i>Orchis incarnata</i> , <i>Pinguicola alpina</i> , <i>Pinguicola vulgaris</i> , <i>Tofieldia calyculata</i> , <i>Primula farinosa</i> , <i>Parnassia palustris</i> , <i>Schoenus nigricans</i> , <i>Schoenus ferrugineus</i> , <i>Spiranthes aestivalis</i> .	
REGIONE BIOGEOGRAFICA Alpina, Continentale, Mediterranea	
PIANO ALTITUDINALE Planiziale, Collinare, Montano	
DISTRIBUZIONE Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Toscana.	
	
NOTE -	