

CODICE CORINE BIOTOPES 54.5 TORBIERE DI TRANSIZIONE	
EUNIS <D2.3	DH = 7140
SINTASSONOMIA <i>Scheuchzeretalia palustris</i>	
DESCRIZIONE Si tratta di sistemi di transizione fra torbiere alte ombrogene e torbiere basse soligeno-topogene. Sono molto diffusi sul sistema alpino. Spesso si tratta di zolle galleggianti, o pratelli inondatai dominati da carici di media taglia, con sfagni e muschi bruni. Si pongono anche sui margini di piccoli corpi idrici. Sono inclusi i tappeti galleggianti a <i>Carex lasiocarpa</i> (54.51), le formazioni di margine delle torbiere a <i>Carex rostrata</i> , e quelle a <i>Carex limosa</i> . Spesso si tratta di piccoli habitat tranne che su alcuni rilievi dove è possibile individuare vasti sistemi complessi riferibili a questo habitat.	
SOTTOCATEGORIE INCLUSE 54.51 Formazioni a <i>Carex lasiocarpa</i> 54.53 Formazioni a <i>Carex rostrata</i> 54.54 Formazioni a <i>Carex limosa</i>	
SPECIE GUIDA <i>Carex lasiocarpa</i> , <i>Carex rostrata</i> , <i>Carex limosa</i> , <i>Scheuchzeria palustris</i> , <i>Menyanthes trifoliata</i> , <i>Epilobium palustre</i> , <i>Pedicularis palustris</i> , <i>Sphagnum papillosum</i> , <i>Sphagnum angustifolium</i> , <i>Sphagnum subsecundum</i> , <i>Sphagnum fimbriatum</i> , <i>Sphagnum riparium</i> , <i>Sphagnum cuspidatum</i> .	
REGIONE BIOGEOGRAFICA Alpina, Continentale	
PIANO ALTITUDINALE Montano, Subalpino, Alpino	
DISTRIBUZIONE Val d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna.	
	
NOTE -	