


## 66 Vulcani

Sono incluse tutte le formazioni direttamente dipendenti da attività vulcaniche recenti.

CODICE CORINE BIOTOPES <b>66.2 AMBIENTI SOMMITALI DEI VULCANI MEDITERRANEI</b>	
EUNIS <b>&lt;H6.2</b>	DH <b>&lt; 8320</b>
SINTASSONOMIA <b><i>Rumici-Astragalatea</i></b>	
DESCRIZIONE Si tratta degli ambienti cacuminali dei cono vulcanici dove è presente una vegetazione di tipo basso arbustivo o erbaceo. In questa classe rientrano le formazioni dell'Etna ad astragali spinosi (31.76) e quelle delle quote superiori a vegetazione erbacea inserite nei <i>Rumici-Astragaletea</i> . Sono qui incluse anche le formazioni presenti nella parte sommitale del Vesuvio e dello Stromboli, che pure stando a quote inferiori, presentano una struttura vegetazionale simile.	
SOTTOCATEGORIE INCLUSE -	
SPECIE GUIDA <i>Anthemis aetnensis</i> , <i>Astragalus siculus</i> , <i>Rumex scutatus</i> fo. <i>aetnensis</i> , <i>Saponaria sicula</i> .	
REGIONE BIOGEOGRAFICA Mediterranea	
PIANO ALTITUDINALE Montano	
DISTRIBUZIONE Etna, Vesuvio, Stromboli	
	
NOTE -	