

**34.313 Prati steppici sub-continentali - Formazioni delle Alpi interne centro-orientali**

**34.314 Prati steppici sub-continentali - Formazioni delle Alpi interne occidentali e appennino sett.**

**34.323 Praterie xeriche del piano collinare, dominate da *Brachypodium rupestre*, *B. caespitosum***

**34.326 Praterie mesiche del piano collinare**

**34.332 Praterie aride dello *Xerobromion***

DESCRIZIONE HABITAT

(34.313) Formazioni limitate alle Valli alpine interne quali la Val Venosta, Valle dell'Adige, Val Pusteria.

(34.314) Formazioni delle valli interne delle Alpi occidentali quali la Val d'Aosta e la Val di Susa.

(34.323) Formazioni dominate da *Brachypodium rupestre* o *Brachypodium caespitosum* che sono diffuse nella fascia collinare su suoli primitivi nell'Appennino.

(34.326) Si tratta di formazioni dominate da *Bromus erectus* e ricche in orchidee che si sviluppano nell'Appennino, su suoli più profondi. Per l'Italia è inclusa la sola categoria del 34.3266. Sono qui riferite anche le praterie del 34.328.

(34.332) Praterie aride aperte nord appenniniche e sud-ovest alpine che si sviluppano su substrati marnoso-arenacei. Esistono anche alcuni sporadici xerobrometi centro-appenninici.

FREQUENZA DELLE SPECIE LICHENICHE

N° totale di specie 78

N° di specie estremamente rare a livello nazionale (potenziale red-list) 4

% di specie estremamente rare rispetto al totale a livello nazionale 1.2

NOTE

I pascoli aridi su substrato calcareo sono generalmente poveri di licheni terricoli, anche se nelle valli alpine a clima subcontinentale possono ospitare alcune specie di steppa.