

**34.74 Praterie montane dell'Appennino centrale e meridionale**

**34.75 Prati aridi sub-mediterranei orientali**

DESCRIZIONE HABITAT

(34.74) Si tratta di tutti i pascoli su substrati basici che si sviluppano dal piano sub-montano a quello altimontano e che sostituiscono lo xero- e meso- *Bromion*. Sono pascoli estensivi che sostituiscono prevalentemente le faggete appenniniche. Sono qui incluse le praterie su substrati basici a carattere mesofilo del piano montano dell'Appennino centro-settentrionale. Il significato di questo habitat è diverso da quello descritto nel manuale Corine Biotopes, infatti ci sono solo parziali corrispondenze con le sottocategorie indicate.

(34.75) A questa categoria viene dato un significato ampio in quanto tutti i recenti studi hanno confermato la penetrazione dei pascoli a carattere illirico lungo il margine meridionale delle Alpi su substrati calcarei. Questa diffusione è certa fino all'area insubrica. Per questo tutte le praterie xeriche e mesoxeriche dei Festuco-Brometea di questi territori vanno riferite a questa tipologia.

FREQUENZA DELLE SPECIE LICHENICHE

|  |     |
|--|-----|
| N° totale di specie  | 98  |
| N° di specie estremamente rare a livello nazionale (potenziale red-list) | 3   |
| % di specie estremamente rare rispetto al totale a livello nazionale     | 0.9 |

NOTE