

41.39 Formazioni postcolturali a frassino maggiore e nocciolo

41.41 Boschi misti di forre e scarpate

DESCRIZIONE HABITAT

(41.39) Vengono qui incluse le formazioni dominate da frassino maggiore (*Fraxinus excelsior*) e acero di monte (*Acer pseudoplatanus*), ben diffuse sulle Alpi e sviluppatasi quasi sempre per abbandono di pascoli su suoli evoluti. Si tratta di strutture anche disomogenee che sono rappresentate da alti arbusteti, preboschi e boschi maturi.

(41.41) Si tratta di formazioni ricche in latifoglie che si sviluppano nelle forre con elevata umidità atmosferica. Sono diffuse nei sistemi prealpini esterni e nell'Appennino. Sono dominate da *Acer pseudoplatanus*, *Fraxinus excelsior*, *Tilia platyphyllos*, *Ulmus glabra* e il sottobosco è ricco di geofite e specie caratteristiche come *Lunaria rediviva*. In questa categoria vengono incluse sia le formazioni pedemontane che quelle di quote maggiori (riferibili per lo più al 41.43).

FREQUENZA DELLE SPECIE LICHENICHE

N° totale di specie	262
N° di specie estremamente rare a livello nazionale (potenziale red-list)	16
% di specie estremamente rare rispetto al totale a livello nazionale	4.7

NOTE

-