

41.81 Boscaglie di *Ostrya carpinifolia*

DESCRIZIONE HABITAT

In questa grande categoria vengono incluse tutte le formazioni dominate nettamente da *Ostrya carpinifolia* (pressoché prive di querce) che si sviluppano sul margine meridionale dell'arco alpino e negli Appennini. Si tratta di formazioni appartenenti a diverse tipologie vegetazionali dagli *Erico-Pinetea* (ostrieti primitivi alpini) a quelli dell'Italia settentrionale (*Ostryo-Carpinion*), della Liguria (*Campanulo mediae-Ostryon*), dell'Italia peninsulare (*Laburno-Ostryon*) e quelle dell'Italia meridionale e insulare (*Pino calabricae-Quercion congestae*). La suddivisione proposta da Corine non si adatta a tale complessità perché distingue le formazioni delle forre mediterranee nell'ambito del *Quercion ilicis* (41.811), le formazioni supramediterranee dei piani collinari (41.813) e gli ostrieti del piano montano in contatto con faggete e pinete degli *Erico-Pinetea* o, in alcuni casi alpini, con alcuni boschi dei *Vaccinio-Picetea*.

FREQUENZA DELLE SPECIE LICHENICHE

N° totale di specie	80
N° di specie estremamente rare a livello nazionale (potenziale red-list)	0
% di specie estremamente rare rispetto al totale a livello nazionale	0

NOTE

Gli ostrieti sono generalmente molto poveri di licheni epifiti.